

ANDROTARDYL 250 mg
Solution injectable intramusculaire

- **Dénomination**

Androtardyl 250 mg/1 ml, solution injectable intramusculaire.

- **Composition qualitative et quantitative**

Enanthate de testostérone250 mg

Excipient : huile de sésame pour une ampoule de 1 ml.

- **Forme pharmaceutique et contenance**

Soluté injectable intramusculaire en ampoule de 1 ml, boîte de 1

- **Classe pharmaco-thérapeutique**

ANDROGENE (H : hormones sexuelles).

- **Nom et adresse de l'exploitant**

BAYER SANTE

220 AVENUE DE LA RECHERCHE

59120 LOOS

- **Nom et adresse du fabricant**

BAYER SCHERING PHARMA A.G.

13342 Berlin

Allemagne

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué en cas de carence en testostérone (diminution de l'hormone mâle).

ATTENTION !

- **Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?**

Ce médicament **ne doit pas être utilisé** en cas de :

- cancer prostatique,
- adénome prostatique,
- cancer du sein chez l'homme
- avant la puberté,
- insuffisance cardiaque, rénale ou hépatique sévères,
- états d'agressivité,
- allergie au produit.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

- **Mises en garde spéciales**

Il est nécessaire de vous faire suivre régulièrement pendant le traitement.

Ce médicament n'est pas indiqué chez la femme car, même si le traitement est de courte durée, il peut entraîner ou favoriser par exemple, l'apparition de poils définitive malgré l'arrêt du traitement.

- **Précautions d'emploi**

En cas de doute, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

- **Interactions médicamenteuses et autres interactions.**

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin et à votre pharmacien.

- **Sportifs**

Cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors de contrôles anti-dopages.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

- **Posologie**

La posologie habituelle est de 1 ampoule injectable par mois, par voie intra-musculaire.

Il est conseillé d'utiliser pour l'injection une seringue de verre. Cependant, compte-tenu des études de compatibilité effectuées avec cette spécialité, il est possible d'utiliser une seringue en polypropylène. Dans ce cas, l'injection doit suivre immédiatement le remplissage de la seringue.

- **Mode et voie d'administration :** voie intramusculaire.

- **Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré :** une ampoule par mois.

- **Effets non souhaités et gênants** (effets indésirables)

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants.

- acné,
- augmentation du volume des seins,
- oedèmes,
- hypercalcémie surtout chez le sujet alité,
- possibilité d'allergie.

Ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure ou égale à 25°C.

- **Date de révision de la notice :** 05.11.09