

NOTICE

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

- 1 QU'EST-CE QUE BETA-ADALATE, gélule ET DANS QUELS CAS EST IL UTILISE ?
- 2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BETA-ADALATE, gélule?
- 3 COMMENT PRENDRE BETA-ADALATE, gélule?
- 4 QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
- 5 COMMENT CONSERVER BETA-ADALATE, gélule?
- 6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1 QU'EST-CE QUE BETA-ADALATE, gélule ET DANS QUEL CAS EST IL UTILISE ?

ASSOCIATION D'UN BETA-BLOQUANT SELECTIF ET D'UN ANTAGONISTE DU CALCIUM (C07FB03 : système cardiovasculaire).

Ce médicament est une association d'un bêta-bloquant et d'un antagoniste du calcium.

Il est préconisé dans l'hypertension artérielle.

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BETA-ADALATE, gélule?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais BETA-ADALATE, gélule dans les cas suivants :

- asthme et bronchopneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères (*formes sévères d'asthme et de maladie des bronches et des poumons avec encombrement*),
- insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement (*défaillance des fonctions du cœur non contrôlées par le traitement*),
- choc cardiogénique (*choc d'origine cardiaque*),
- bloc auriculo-ventriculaire des second et troisième degrés non appareillés (*certaines cas de troubles de la conduction cardiaque*),
- infarctus du myocarde datant de moins de 1 mois, angor instable (*angine de poitrine non stable*),

- angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie) (*variété de crises d'angine de poitrine*),
- maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire),
- bradycardie importante (< 45-50 battements par minute) (*ralentissement du rythme cardiaque*),
- phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères (*troubles circulatoires symétriques des doigts avec engourdissements et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères*),
- phéochromocytome non traité (*excroissance de la glande médullosurrénale sécrétant des substances provoquant une hypertension artérielle sévère*),
- hypotension (*diminution de la pression artérielle*),
- hypersensibilité à l'aténolol, à la nifédipine (*allergie à l'aténolol, à la nifédipine*),
- antécédent de réaction anaphylactique (*antécédent de réaction allergique*),
- association à la floctafénine (*médicament de la douleur*), et au sultopride (*médicament du système nerveux*).

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé avec l'amiodarone (*médicament pour le cœur*), le dantrolène, la ciclosporine, et pendant la grossesse ou l'allaitement.

Faites attention avec BETA ADALATE, gélule

Mises en garde spéciales

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare).

NE JAMAIS INTERROMPRE BRUTALEMENT LE TRAITEMENT SANS AVIS DE VOTRE MEDECIN.

Précautions d'emploi

Prévenir le médecin en cas de grossesse, allaitement, diabète, insuffisance rénale, certaines maladies des artères (syndrome de Raynaud), insuffisance cardiaque. Si vous devez subir une intervention chirurgicale, avertissez l'anesthésiste que vous prenez ce médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, et notamment avec l'amiodarone, le dantrolène, la ciclosporine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement

La découverte d'une grossesse alors que vous preniez ce médicament nécessite de modifier votre traitement antihypertenseur. Prévenez le médecin chargé de surveiller votre grossesse, il vous conseillera un traitement plus adapté.

Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient de ne pas l'utiliser pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

Liste des excipients à effet notoire : Lactose.

3. COMMENT PRENDRE BETA ADALATE, gélule ?

Posologie

La posologie usuelle est d'une gélule par jour.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les gélules doivent être avalées avec une boisson.

Fréquence d'administration / durée d'administration

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A LA PRESCRIPTION MEDICALE.

Si vous avez pris plus de BETA ADALATE, gélule que vous n'auriez du :

Prévenir votre médecin ou l'hôpital.

si vous oubliez de prendre BETA ADALATE, gélule :

En cas d'oubli, prendre dès que possible votre gélule et poursuivre votre traitement normalement. Ne jamais prendre une double dose.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet

4 QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, BETA ADALATE, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

Les plus fréquemment rapportés sont : fatigabilité, refroidissement des extrémités, ralentissement du pouls, troubles gastro-intestinaux (y compris diarrhée), impuissance, maux de tête, rougeurs du visage accompagnées ou non de bouffées de chaleur, oedèmes des membres inférieurs (*infiltration de liquide dans les jambes*).

Possibilité de survenue de crampes, réactions d'hypersensibilité à type de prurit, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique ainsi que des réactions cutanées diverses notamment des éruptions ressemblant au psoriasis.

Beaucoup plus rarement : ralentissement important du cœur, insuffisance cardiaque, chute de tension, crise d'asthme, hypoglycémie (*quantité insuffisante de sucre dans le sang*), syndrome de Raynaud, aggravation d'une claudication (*difficulté à marcher*) intermittente existante, étourdissements, fatigue, allergie, quelques cas d'inflammation des gencives régressant à l'arrêt du traitement.

Exceptionnellement : atteintes du foie disparaissant à l'arrêt du traitement. Très rarement, troubles associant une rigidité, des tremblements et/ou des mouvements anormaux

Chez certains patients des douleurs peuvent survenir dans les 30 minutes suivant la prise de ce médicament. Il faut en avertir votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5 COMMENT CONSERVER BETA ADALATE, gélule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Ne pas utiliser BETA ADALATE, gélule après la date de péremption mentionnée sur la boîte

Ce médicament est à conserver à une température inférieure à 25°, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient BETA ADALATE, gélule?

Les substances actives sont:

Nifédipine.....	20 mg
Aténolol	50 mg
Pour une gélule	

Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline, amidon de maïs, lactose monohydraté, polysorbate 80, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 4000, dioxyde de titane (E 171), oxyde de fer rouge (E 172), carbonate de magnésium lourd, laurylsulfate de sodium, gélatine, stéarate de magnésium.

Composition de l'enveloppe de la gélule

Corps (rouge brun) et tête (rouge brun) : gélatine, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer rouge (E172).

Composition de l'encre d'impression : Opacode S-1-7085 blanc (gomme laque, dioxyde de titane (E171), alcool isopropylique, hydroxyde d'ammonium, N-butyl alcool, propylène glycol, siméthicone)

Qu'est ce que BETA ADALATE, gélule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de capsule. Boite de 28, 30, 50, 90 ou 100

Titulaire :

BAYER SANTE
220 avenue de la Recherche
59120 LOOS

Exploitant :

BAYER SANTE
220 avenue de la Recherche
59120 LOOS

Fabricant :

BAYER PHARMA AG
51368 Leverkusen
Allemagne

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 23 janvier 2012

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).