

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Dénomination du médicament

BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable

Praziquantel

Encadré

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable ?
3. COMMENT PRENDRE BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

1. QU'EST-CE QUE BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement des maladies dues à certains parasites, (trématodes) telles que :

- bilharzioses : *Schistosoma haematobium*, *Schistosoma intercalatum*, *Schistosoma japonicum*, *Schistosoma mansoni*,
- distomatoses :
douxes du foie : *Clonorchis sinensis*, *Opisthorchis viverrini*,
douxes pulmonaires : *Paragonimus westermani*.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable :

- si vous êtes allergique au praziquantel ou à l'un des autres composants contenus dans BILTRICIDE,
- si vous êtes atteint d'une cysticercose oculaire (maladie parasitaire affectant les yeux),
- pendant les 3 premiers mois de la grossesse,
- si vous allaitez.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable:

Mises en garde spéciales

En règle générale, BILTRICIDE ne doit pas être utilisé au cours des trois premiers mois de la grossesse, bien que les expérimentations animales n'aient pas mis en évidence d'effet toxique chez la mère ou chez l'enfant.

En cas d'allaitement, celui-ci sera interrompu le jour de la prise du produit ainsi que durant les 72 heures suivant son absorption.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi

En cas d'antécédents de troubles du rythme cardiaque, informez-en votre médecin.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, *notamment la rifampicine, les anticonvulsivants inducteurs enzymatiques (carbamazépine, phénytoïne, phénobarbital, primidone) et la dexaméthasone*, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, même s'il s'agit d'un médicament pris sans ordonnance.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

En règle générale, BILTRICIDE ne doit pas être utilisé au cours des trois premiers mois de la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Les mères qui allaitent peuvent être traitées à condition que l'enfant ne soit pas nourri au sein le jour du traitement et les 72 heures suivantes.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est déconseillé de conduire et d'utiliser certains outils ou machines pendant la durée du traitement et jusqu'à 24 h après son arrêt en raison du risque de troubles de la vigilance.

Liste des excipients à effet notoire

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez l'impression que l'effet de BILTRICIDE est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être pris avec un peu de liquide, sans les croquer, à la suite d'un repas si possible.

La posologie est variable selon le parasite:

<i>Schistosoma haematobium</i>	Une dose unique de 40 mg par kg de poids corporel.
<i>Schistosoma mansoni</i> <i>Schistosoma intercalatum</i>	Une dose unique de 40 mg ou 2 doses de 20 mg par kg de poids corporel en 24 heures.
<i>Schistosoma japonicum</i>	Une dose unique de 60 mg ou 2 doses de 30 mg par kg de poids corporel en 24 heures.
<i>Clonorchis sinensis</i> <i>Opisthorchis viverrini</i>	3 doses de 25 mg par kg de poids corporel réparties sur 24 heures.
<i>Paragonimus westermani</i>	3 x 25 mg/jour par kg de poids corporel pendant 2 jours.

Fréquence d'administration

En cas de prises répétées dans la même journée, l'intervalle entre chaque prise ne doit pas être inférieur à 4 heures et ne doit pas dépasser 6 heures.

Durée du traitement

La dose de BILTRICIDE que vous devez utiliser et le rythme d'administration sont déterminés par le médecin traitant en fonction de chaque cas individuel et du parasite en cause.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable que vous n'auriez dû : consultez votre médecin.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- fièvre, fatigue, maux de tête, réaction allergique avec démangeaisons;
- douleurs abdominales, nausées, perte d'appétit, vomissements, diarrhée (parfois avec présence de sang);
- vertiges, somnolence, convulsions;
- douleurs musculaires ou articulaires;
- troubles du rythme cardiaque (exceptionnel).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

Pas de conditions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable ?

La substance active est:

Praziquantel 600,0 mg

Pour un comprimé pelliculé quadrisécable.

Les autres composants sont :

Amidon de maïs, polyvidone excipient, laurylsulfate de sodium, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose, polyoxyéthylène glycol 4000, dioxyde de titane.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est ce que BILTRICIDE, comprimé pelliculé quadrisécable et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé quadrisécable. Boîte de 6.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

BAYER SANTE

220 avenue de la Recherche
59120 LOOS
FRANCE

Exploitant

BAYER SANTE

220 avenue de la Recherche
59120 LOOS
FRANCE

Fabricant

BAYER PHARMA AG

51368 LEVERKUSEN
ALLEMAGNE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 04 janvier 2012.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.